

Tabla 4. Límites de captura.

| STOCKS | TEMPORADAS | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
| HEMISFERIO SUR | | | | | | | | | | | |
| Rorcual de minke del Antártico - 130°E hasta 145°W | 400 ⁷ | 0 | 400 ⁷ | 0 | 400 ⁷ | 0 | 200 ⁷ | 0 | 200 ⁷ | 0 | |
| Rorcual de minke del Antártico – 35°E hasta 170°E | 0 | 400 ⁷ | 0 | 400 ⁷ | 0 | 200 ⁷ | 0 | 200 ⁷ | 0 | 200 ⁷ | |
| Aleta –130°E hasta 145°W | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Aleta - 35°E hasta 170°E | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Jorobada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| HEMISFERIO NORTE | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pacífico Norte | | | | | | | | | | | |
| Ballena de Groenlandia –Stock Mares Bering-Chukchi-Beaufort | | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ | 67 ⁸ |
| Gris – stock oriental | | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ | 145 ⁹ |
| Bryde – occidental (oeste de 170°E) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rorcual común de minke – aguas costeras al este de Japón al norte de 35°N y oeste de 150°E (excluyendo el Mar de Okhotsk), excluyendo las aguas dentro de las 10 millas náuticas de la costa Pacífica del norte de Japón. ¹⁰ | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rorcual común de minke – altamar | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sei – occidental (oeste de 170°E) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cachalote – occidental (oeste de 170°E) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⁷ Este es el número máximo de animales que pueden ser impactados en un año dado excepto que cualquier impacto no utilizado en un año puede ser transferido al siguiente límite en la misma área (es decir, 2 temporadas más adelante) hasta un total de [número a ser decidido].

⁸ Este es el número máximo de animales que pueden ser impactados en un año dado excepto que cualquier impacto no utilizado (incluyendo 15 impactos no utilizados del período 2007-2010) puede ser transferido a años subsiguientes hasta un máximo de 15 impactos adicionales en un año dado. El número total de animales que pueden ser descargados a lo largo de 10 temporadas de 2011-2020 es de 580.

⁹ Este es el número máximo de animales que pueden ser impactados en un año dado. El número total de animales que pueden ser descargados a lo largo de 10 temporadas de 2011-2020 es de 1.290.

¹⁰ La temporada ballenera estará limitada a un período consecutivo de seis meses dentro del período del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. La caza de ballenas se realizará de conformidad con el marco establecido en IWC/60/9 que describe la propuesta de Caza Costera de Pequeña Escala de Japón para beneficio de cuatro comunidades en Japón.

| HEMISFERIO NORTE (Continúa) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Atlántico Norte | | | | | | | | | | |
| Ballena de Groenlandia – Stock Canadá Oriental/Groenlandia Occidental | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ | 2 ¹¹ |
| Aleta – Groenlandia Occidental | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Aleta – Islandia Occidental <i>Pequeña Área</i> ¹² | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Común de minke – Groenlandia Occidental | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ | 178 ¹³ |
| Común de minke – Atlántico Central – <i>Pequeñas Áreas</i> | | | | | | | | | | |
| Costera Groenlandia Oriental | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CIC ¹⁴ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Común de minke – Atlántico Oriental <i>Pequeñas Áreas</i> ¹⁵ | | | | | | | | | | |
| EB | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| EN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ES | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| EW | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Jorobada – capturada cerca de San Vicente y las Granadinas | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ | 4 ¹⁶ |
| Jorobada – agregación de alimentación en Groenlandia Occidental | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

¹¹ Este es el número máximo de animales que pueden ser impactados en un año dado excepto que cualquier impacto no utilizado de un año puede ser transferido a años subsiguientes hasta un máximo de 2 impactos adicionales en un año dado.

¹² WI: El área al Oeste del meridiano 18°W y entre los paralelos 50°N y 75°N y al Este de la línea de 50°N 30°W, 60°N 30°W, 60°N 31°W, 65°N 31°W, 66°50'N 27°W y 69°N 27°W.

¹³ Esto representa el número máximo de animales que pueden ser impactados en un año dado excepto que cualquier impacto no utilizado puede ser transferido a años subsiguientes hasta un máximo de 15 impactos adicionales en un año dado.

¹⁴ CIC: El área entre 63°N y 67.5°N y entre 12°W y 25°W.

¹⁵ EB: El área al Este de (e incluyendo) el meridiano 28°E.

ES: El área al Oeste del meridiano 28°E y al Norte de una línea que cruza 73°N 28°E, 73°N 3°E, 74°N 3°E y 74°N 21°W.

EW: El área al Norte del paralelo 62°N y al Oeste del meridiano 28°E y al Sur y al Este de una línea que cruza 73°N 28°E, 73°N 3°E, 68°N 3°E, 65°N 5°W, 63°N 12°W y 60°N 18°W.

EN: El área al Sur del paralelo 62°N y al Este de una línea que cruza 63°N 12°W, 60°N 18°W y 20°N 18°W.

¹⁶ Esto representa el número promedio de ballenas que pueden ser descargadas en un año dado. El número total que puede ser descargado a lo largo de 10 temporadas de 2011-2020 no excederá 40.